

KÖKTEN  
YAPRAĞA  
SORUNSUZ  
BESLEME



**FERTSA  
BLACK**  
SIVI HUMİK  
ASİT

Garanti Edilen İçerik	%w/w
Organik Madde	10
Toplam Humik Asit + Fulvik Asit	18
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K <sub>2</sub> O)	3
pH	10,8-12,8

## TAVSİYE EDİLEN DOZLAR

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN	DAMLA SULAMADAN
		cc/100L SU	L/da (1 ton su)
Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan	Fide dikimden itibaren hasada kadar 7-10 günlük aralıklarla uygulayınız.	300	2,5 - 3,0 L
Sert Çekirdekli Meyveler (Kiraz,Erik,Kayısı,Şeftali)	Sürgün gelişim döneminden itibaren 7-10 günlük aralıklarla uygulayınız.	250	2,0 - 2,5 L
Yumuşak Çekirdekli Meyveler (Elma,Armut,Ayva)	Dikimden itibaren hasada kadar 7-10 günlük aralıklarla uygulayınız.	250	2,0 - 2,5 L
Marul,Lahana,Brokoli,Karnabahar	Gelişme dönemi boyunca 14 gün aralıklarla uygulayınız.	300	2,5 - 3,0 L
Buğday,Arpa,Çeltik,Kanola,Yer Fıstığı,Yulaf	3-5 Yaprak dönemi ve kardeşlenme evresinde	300	2,5 - 3,0 L
Fasulye,Nohut,Mercimek,Bakla,Bezelye	Çiçeklenme dönemi öncesi ve tane oluşum döneminde 2 uygulama olarak uygulayınız.	300	2,5 - 3,0 L
Kavun, Karpuz, Kabak	Fide dikimden itibaren hasada kadar 7-10 günlük aralıklarla uygulayınız.	250	2,0 - 2,5 L
Soğan, Sarımsak	Dikimden itibaren hasada kadar 7-10 günlük aralıklarla uygulayınız.	250	2,0 - 2,5 L
Mısır,Ayçiçeği,Susam,Aspir,Pamuk	Gelişme,4 ve 8 yaprak dönemlerinde 10-14 gün aralıklarla uygulayınız.	300	2,5 - 3,0 L
Fındık,Ceviz,Badem	Gelişmenin erken dönemlerinde 10-14 gün aralıklarla 4 uygulama olarak uygulayınız.	300	2,5 - 3,0 L
Potates, Pancar, Havuç	4-5 yaprak döneminden itibaren ve yumru gelişme döneminde 2 uygulama olarak uygulayınız.	300	2,5 - 3,0 L
Çilek, Bağ,Muz,Turunçgiller,Zeytin	İlk bahar döneminden itibaren hasada kadar 7-10 gün aralıklarla uygulayınız.	300	2,5 - 3,0 L