



**FERTSA
DENSE
3-0-30+ME
NK GÜBRE
ÇÖZELTİSİ**

Garanti Edilen İçerik	%w/w
Toplam Azot (N)	3
Üre Azotu (N-NH ₂)	3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	30
Suda Çözünür Bor (B)	0,2
Suda Çözünür Molibden (Mo)	0,002

TAVSİYE EDİLEN DOZLAR

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN	DAMLAMADAN
		cc/100L SU	L/da (1 ton su)
Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan	Dikim öncesi ve çıkış dönemlerinde meyve olgulaşma dönemine kadar uygulanabilir.	200	1,5 - 2,0 L
Sert Çekirdekli Meyveler (Kiraz, Erik, Kayısı, Şeftali)	Sonbahar ve kış dönemlerinde uygulayınız	150	1,0 - 1,5 L
Yumuşak Çekirdekli Meyveler (Elma, Armut, Ayva)	Sonbahar ve kış dönemlerinde uygulayınız	150	1,0 - 1,5 L
Marul, Lahana, Brokoli, Karnabahar	Gelişme dönemi boyunca uygulayınız.	200	1,5 - 2,0 L
Buğday, Arpa, Çeltik, Kanola, Yer Fıstığı, Yulaf	Kardelenme ve sapa kalkma döneminde uygulayınız	200	1,5 - 2,0 L
Fasulye, Nohut, Mercimek, Bakla, Bezelye	Büyüme dönemi başlangıcında uygulayınız	200	1,5 - 2,0 L
Kavun, Karpuz, Kabak	Fide dikimden itibaren hasada kadar 7-10 günlük aralıklarla uygulayınız.	150	1,0 - 1,5 L
Soğan, Sarımsak	Dikimden itibaren hasada kadar 7-10 günlük aralıklarla uygulayınız.	150	1,0 - 1,5 L
Mısır, Ayçiçeği, Susam, Aspir, Pamuk	Gelişme, 4 ve 8 yaprak dönemlerinde 10-14 gün aralıklarla uygulayınız.	200	1,5 - 2,0 L
Fındık, Ceviz, Badem	Gelişmenin erken dönemlerinde uygulayınız.	200	1,5 - 2,0 L
Patates, Pancar, Havuç	4-5 yaprak döneminden itibaren ve yumru gelişme döneminde 2 uygulama olarak uygulayınız.	200	1,5 - 2,0 L
Çilek, Bağ, Muz, Turuncgiller, Zeytin	Dikim öncesi ve çıkış dönemlerinde meyve olgulaşma dönemine kadar uygulanabilir.	200	1,5 - 2,0 L