

KÖKTEN
YAPRAĞA
SORUNSUZ
BESLEME



FERTSA
FORM
5-5-10
NPK'LI SIVI
ORGANOMİNERAL
GÜBRE

Garanti Edilen İçerik	%w/w
Organik Madde	30
Toplam Azot (N)	5
Organik Azot (N)	0,5
Nitrat Azotu (N - NO ₃)	1
Üre Azotu (N-NH ₂)	3,5
Toplam Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	5
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	10
Suda Çözünür Bor (B)	0,2
Suda Çözünür Malibden (Mo)	0,002
Serbest Aminoasitler	5
Maksimum Klor (Cl) %	1
ph	2,9-4,9

TAVSİYE EDİLEN DOZLAR

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN	DAMLA SULAMADAN
		cc/100L SU	L/da (1 ton su)
Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan	Fide dikimden itibaren hasada kadar 7-10 günlük aralıklarla uygulayınız.	300	2,5 - 3,0 L
Sert Çekirdekli Meyveler (Kiraz, Erik, Kayısı, Şeftali)	Dikimden itibaren hasada kadar 7-10 günlük aralıklarla uygulayınız.	250	2,0 - 2,5 L
Yumuşak Çekirdekli Meyveler (Elma, Armut, Ayva)	Dikimden itibaren hasada kadar 7-10 günlük aralıklarla uygulayınız.	250	2,0 - 2,5 L
Marul, Lahana, Brokoli, Karnabahar	Gelişme dönemi boyunca 7-10 gün aralıklarla uygulayınız.	300	2,5 - 3,0 L
Buğday, Arpa, Çeltik, Kanola, Yer Fıstığı, Yulaf	Tohumdan hasada kadar gelişme dönemi boyunca uygulanabilir	300	2,5 - 3,0 L
Fasulye, Nohut, Mercimek, Bakla, Bezelye	Çiçeklenme dönemi öncesi ve tane oluşum döneminde 2 uygulama olarak uygulayınız.	300	2,5 - 3,0 L
Kavun, Karpuz, Kabak	Fide dikimden itibaren hasada kadar 7-10 günlük aralıklarla uygulayınız.	250	2,0 - 2,5 L
Sağan, Sarımsak	Dikimden itibaren hasada kadar 7-10 günlük aralıklarla uygulayınız.	250	2,0 - 2,5 L
Mısır, Ayçiçeği, Susam, Aspir, Pamuk	Gelişme, 4 ve 8 yaprak dönemlerinde 10-14 gün aralıklarla uygulayınız.	300	2,5 - 3,0 L
Fındık, Ceviz, Badem	Gelişmenin erken dönemlerinde 10-14 gün aralıklarla 4 uygulama olarak uygulayınız.	300	2,5 - 3,0 L
Patates, Pancar, Havuç	4-5 yaprak döneminden itibaren ve yumru gelişme döneminde 2 uygulama olarak uygulayınız.	300	2,5 - 3,0 L
Çilek, Bağ, Muz, Turunçgiller, Zeytin	İlk bahar döneminden itibaren hasada kadar 7-10 gün aralıklarla uygulayınız.	300	2,5 - 3,0 L