



**FERTSA  
FRESH**  
SIVI MİKRO BİTKİ  
BESİN MADDELERİ  
KARIŞIMI

**GARANTİ EDİLEN İÇERİK**

%w/w

Suda Çözünür Bor (B)	0,2
Suda Çözünür Molibden (Mo)	0,02
Suda Çözünür Çinko (Zn)	3,5

**TAVSİYE EDİLEN DOZLAR**

Bitki	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN DAMLA SULAMADAN	
		cc/100L SU	L/da (1 ton su)
Domates, Biber, Patlıcan	Dikimden itibaren hasada kadar 7-10 günlük aralıklarla uygulayınız.	350	1,5 - 2,5 L
Sert Çekirdekli Meyveler (Kiraz, Erik, Kayısı, Şeftali)	Dikimden itibaren hasada kadar 7-10 günlük aralıklarla uygulayınız.	300	1,0 - 2,0 L
Yumuşak Çekirdekli Meyveler (Elma, Armut, Ayva)	Dikimden itibaren hasada kadar 7-10 günlük aralıklarla uygulayınız.	300	1,0 - 2,0 L
Marul, Lahana, Brokoli, Karnabahar	Gelişme dönemi boyunca 7-10 gün aralıklarla uygulayınız.	350	1,5 - 2,5 L
Buğday, Arpa, Çeltik, Kanola, Yer Fıstığı, Yulaf	Tohumdan hasada kadar gelişme dönemi boyunca uygulanabilir	350	1,5 - 2,5 L
Fasulye, Nohut, Mercimek, Bakla, Bezelye	Gelişme dönemi boyunca 7-10 gün aralıklarla uygulayınız.	350	1,5 - 2,5 L
Pamuk	Gelişme dönemi başları aktif olarak büyüme döneminde 10-14 gün aralıklarla uygulayınız.	300	1,0 - 2,0 L
Kavun, Karpuz, Kabak	Dikimden itibaren hasada kadar 7-10 günlük aralıklarla uygulayınız.	300	1,0 - 2,0 L
Soğan, Sarımsak	Çıkıştan sonra 7-10 gün araya 4 uygulama olarak uygulayınız.	300	1,0 - 2,0 L
Üzüm	Çiçeklenme döneminden itibaren 10-14 gün aralıklarla 4 uygulama olarak uygulayınız.	300	1,0 - 2,0 L
Zeytin	Çiçeklenme dönemi öncesinden itibaren 10-14 gün aralıklarla 4 uygulama olarak uygulayınız.	300	1,0 - 2,0 L
Mısır, Ayçiçeği, Susam, Aspir	Gelişmenin erken dönemlerinde 10-14 gün aralıklarla 4 uygulama olarak uygulayınız.	350	1,5 - 2,5 L
Fındık, Ceviz, Badem	Gelişmenin erken dönemlerinde 10-14 gün aralıklarla 4 uygulama olarak uygulayınız.	350	1,5 - 2,5 L
Tütün, Çay, Gül	Bitki boyu 30cm olduğunda uygulamaya başlanabilir. Gerekliğinde 10-14 gün sonra tekrarlanabilir.	350	1,5 - 2,5 L
Patates, Pancar, Havuç	Çıkıştan sonra 7-10 gün araya 4 uygulama olarak uygulayınız.	350	1,5 - 2,5 L
Çilek	Çiçeklenme dönemi öncesinden itibaren 10-14 gün aralıklarla 4 uygulama olarak uygulayınız.	350	1,5 - 2,5 L
Muz	Gelişme dönemi boyunca 10-14 gün aralıklarla uygulayınız.	300	1,0 - 2,0 L
Turungiller	Çiçeklenme öncesi 10-14 gün araya tekrarlayınız. Hasattan sonra, yapraklar dökülmeden önce de uygulayınız.	350	1,5 - 2,5 L
Yonca, Korunga	Dikimden itibaren hasada kadar 7-10 günlük aralıklarla uygulayınız.	350	1,5 - 2,5 L