

# KÖKTEN YAPRAĞA SORUNSUZ BESLEME

## FERTSA LIBRA 7-7-7+ME

NPK'LI SIVI  
ORGANOMİNERAL  
GÜBRE



Garanti Edilen İçerik	%w/w
Organik Madde	15
Toplam Azot (N)	7
Organik Azot (N)	0,5
Nitrat Azotu (N - NO <sub>3</sub> )	1,5
Üre Azotu (N-NH <sub>2</sub> )	5
Toplam Fosfor Pentaoksit (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	7
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	7
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K <sub>2</sub> O)	7
Suda Çözünür Bor (B)	0,2
Suda Çözünür Molibden (Mo)	0,002
Serbest Aminoasitler	5
Maksimum Klor (Cl) %	1
pH	2,2-4,2

## TAVSİYE EDİLEN DOZLAR

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN	DAMLA
		cc/100L SU	SULAMADAN
			L/da (1 ton su)
Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan	Fide dikimden itibaren hasada kadar 7-10 günlük aralıklarla uygulayınız.	250	2,0 - 2,5 L
Sert Çekirdekli Meyveler (Kiraz,Erik,Kayısı,Şeftali)	Dikimden itibaren hasada kadar 7-10 günlük aralıklarla uygulayınız.	200	2,0 - 2,0 L
Yumuşak Çekirdekli Meyveler (Elma,Armut,Ayva)	Dikimden itibaren hasada kadar 7-10 günlük aralıklarla uygulayınız.	200	2,0 - 2,0 L
Yumuşak Çekirdekli Meyveler (Elma,Armut,Ayva)	Gelişme dönemi boyunca 7-10 gün aralıklarla uygulayınız.	250	2,0 - 2,5 L
Buğday, Arpa,Çeltik,Kanola,Yer Fıstığı,Yulaf	Tohumdan hasada kadar gelişme dönemi boyunca uygulanabilir	250	2,0 - 2,5 L
Fasulye,Nohut,Mercimek,Bakla,Bezelye	Çiçeklenme dönemi öncesi ve tane oluşum döneminde 2 uygulama olarak uygulayınız.	250	2,0 - 2,5 L
Kavun, Karpuz, Kabak	Fide dikimden itibaren hasada kadar 7-10 günlük aralıklarla uygulayınız.	200	2,0 - 2,0 L
Sağan, Sarımsak	Dikimden itibaren hasada kadar 7-10 günlük aralıklarla uygulayınız.	200	2,0 - 2,0 L
Mısır,Ayçiçeği,Susam,Aspir,Pamuk	Gelişme,4 ve 8 yaprak dönemlerinde 10-14 gün aralıklarla uygulayınız.	250	2,0 - 2,5 L
Fındık,Ceviz,Badem	Gelişmenin erken dönemlerinde 10-14 gün aralıklarla 4 uygulama olarak uygulayınız.	250	2,0 - 2,5 L
Patates, Pancar, Havuç	4-5 yaprak döneminden itibaren ve yumru gelişme döneminde 2 uygulama olarak uygulayınız.	250	2,0 - 2,5 L
Çilek, Bağ,Muz,Turunçgiller,Zeytin	İlk bahar döneminden itibaren hasada kadar 7-10 gün aralıklarla uygulayınız.	250	2,0 - 2,5 L