

KÖKTEN
YAPRAĞA
SORUNSUZ
BESLEME



**FERTSA
MICRO PLUS**
İZ ELEMENT
KATKILI SIVI
ORGANOMİNERAL
GÜBRE

Garanti Edilen İçerik	%w/w
Organik Madde	15
Suda Çözünür Bor (B)	0,2
Suda Çözünür Molibden (Mo)	0,002
Suda Çözünür Çinko (Zn)	2
Maksimum Klor (Cl) %	1
ph	2,9-4,9

TAVSİYE EDİLEN DOZLAR

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN	DAMLA SULAMADAN
		cc/100L SU	L/da (1 ton su)
Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan	Fide dikimden itibaren hasada kadar 7-10 günlük aralıklarla uygulayınız.	300	2,5 - 3,0 L
Sert Çekirdekli Meyveler (Kiraz,Erik,Kayısı,Şeftali)	Dikimden itibaren hasada kadar 7-10 günlük aralıklarla uygulayınız.	250	2,0 - 2,5 L
Yumuşak Çekirdekli Meyveler (Elma,Armut,Ayva)	Dikimden itibaren hasada kadar 7-10 günlük aralıklarla uygulayınız.	250	2,0 - 2,5 L
Marul,Lahana,Brokoli,Karnabahar	Gelişme dönemi boyunca 7-10 gün aralıklarla uygulayınız.	300	2,5 - 3,0 L
Buğday,Arpa,Çeltik,Kanola,Yer Fıstığı,Yulaf	Tohumdan hasada kadar gelişme dönemi boyunca uygulanabilir	300	2,5 - 3,0 L
Fasulye,Nohut,Mercimek,Bakla,Bezelye	Çiçeklenme dönemi öncesi ve tane oluşum döneminde 2 uygulama olarak uygulayınız.	300	2,5 - 3,0 L
Kavun, Karpuz, Kabak	Fide dikimden itibaren hasada kadar 7-10 günlük aralıklarla uygulayınız.	250	2,0 - 2,5 L
Sağan, Sarımsak	Dikimden itibaren hasada kadar 7-10 günlük aralıklarla uygulayınız.	250	2,0 - 2,5 L
Mısır,Ayçiçeği,Susam,Aspir,Pamuk	Gelişme,4 ve 8 yaprak dönemlerinde 10-14 gün aralıklarla uygulayınız.	300	2,5 - 3,0 L
Fındık,Ceviz,Badem	Gelişmenin erken dönemlerinde 10-14 gün aralıklarla 4 uygulama olarak uygulayınız.	300	2,5 - 3,0 L
Patates, Pancar, Havuç	4-5 yaprak döneminden itibaren ve yumru gelişme döneminde 2 uygulama olarak uygulayınız.	300	2,5 - 3,0 L
Çilek, Bağ,Muz,Turunçgiller,Zeytin	İlk bahar döneminden itibaren hasada kadar 7-10 gün aralıklarla uygulayınız.	300	2,5 - 3,0 L