

KÖKTEN
YAPRAĞA
SORUNSUZ
BESLEME

FERTSA
PRIME
5 - 15 - 0 +
ME
NP GÜBRE
ÇÖZELTİSİ



| Garanti Edilen İçerik | %w/w |
|---|-------|
| Toplam Azot (N) | 5 |
| Amonyum Azotu (N-NH ₄) | 1 |
| Üre Azotu (N-NH ₂) | 4 |
| Suda Çözünür Forfor Pentaoksit (P ₂ O ₅) | 15 |
| Suda Çözünür Bor (B) | 0,2 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) | 0,01 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) | 0,02 |
| Suda Çözünür Molibden (Mo) | 0,002 |

TAVSİYE EDİLEN DOZLAR

| Bitki | UYGULAMA ZAMANI | YAPRAKTAN | DAMLA SULAMADAN |
|--|--|------------|-----------------|
| | | cc/100L SU | L/da (1 ton su) |
| Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan | Fide dikimden itibaren hasada kadar 7-10 günlük aralıklarla uygulayınız. | 200 | 1,5 - 2,0 L |
| Sert Çekirdekli Meyveler (Kiraz, Erik, Kayısı, Şeftali) | Dikimden itibaren hasada kadar 7-10 günlük aralıklarla uygulayınız. | 150 | 1,0 - 1,5 L |
| Yumuşak Çekirdekli Meyveler (Elma, Armut, Ayva) | Dikimden itibaren hasada kadar 7-10 günlük aralıklarla uygulayınız. | 150 | 1,0 - 1,5 L |
| Marul, Lahana, Brokoli, Karnabahar | Gelişme dönemi boyunca 7-10 gün aralıklarla uygulayınız. | 200 | 1,5 - 2,0 L |
| Buğday, Arpa, Çeltik, Kanola, Yer Fıstığı, Yulaf | Tohumdan hasada kadar gelişme dönemi boyunca uygulanabilir | 200 | 1,5 - 2,0 L |
| Fasulye, Nohut, Mercimek, Bakla, Bezelye | Çiçeklenme dönemi öncesi ve tane oluşum döneminde 2 uygulama olarak uygulayınız. | 200 | 1,5 - 2,0 L |
| Kavun, Karpuz, Kabak | Fide dikimden itibaren hasada kadar 7-10 günlük aralıklarla uygulayınız. | 150 | 1,0 - 1,5 L |
| Soğan, Sarımsak | Dikimden itibaren hasada kadar 7-10 günlük aralıklarla uygulayınız. | 150 | 1,0 - 1,5 L |
| Mısır, Ayçiçeği, Susam, Aspir, Pamuk | Gelişme, 4 ve 8 yaprak dönemlerinde 10-14 gün aralıklarla uygulayınız. | 200 | 1,5 - 2,0 L |
| Fındık, Ceviz, Badem | Gelişmenin erken dönemlerinde 10-14 gün aralıklarla 4 uygulama olarak uygulayınız. | 200 | 1,5 - 2,0 L |
| Patates, Pancar, Havuç | 4-5 yaprak döneminden itibaren ve yumru gelişme döneminde 2 uygulama olarak uygulayınız. | 200 | 1,5 - 2,0 L |
| Çilek, Bağ, Muz, Turuncgiller, Zeytin | İlk bahar döneminden itibaren hasada kadar 7-10 gün aralıklarla uygulayınız. | 200 | 1,5 - 2,0 L |