

KÖKTEN
YAPRAĞA
SORUNSUZ
BESLEME

FERTSA
SOLDE
7-7-7+ME
NPK GÜBRE
ÇÖZELTİSİ



Garanti Edilen İçerik	%w/w
Toplam Azot (N)	7
Amonyum Azotu (N-NH ₄)	2
Nitrat Azotu (N-NO ₃)	2
Üre Azotu (N-NH ₂)	3
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	7
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	7
Suda Çözünür Bor (B)	0,2
Suda Çözünür Bakır (Cu)	0,02
Suda Çözünür Mangan (Mn)	0,1
Suda Çözünür Molibden (Mo)	0,002
Suda Çözünür Çinko (Zn)	2

TAVSİYE EDİLEN DOZLAR

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN	DAMLA SULAMADAN
		cc/100L SU	L/da (1 ton su)
Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan	Fide dikimden itibaren hasada kadar 7-10 günlük aralıklarla uygulayınız.	200	1,5 - 2,0 L
Sert Çekirdekli Meyveler (Kiraz, Erik, Kayısı, Şeftali)	Dikimden itibaren hasada kadar 7-10 günlük aralıklarla uygulayınız.	150	1,0 - 1,5 L
Yumuşak Çekirdekli Meyveler (Elma, Armut, Ayva)	Dikimden itibaren hasada kadar 7-10 günlük aralıklarla uygulayınız.	150	1,0 - 1,5 L
Marul, Lahana, Brokoli, Karnabahar	Gelişme dönemi boyunca 7-10 gün aralıklarla uygulayınız.	200	1,5 - 2,0 L
Buğday, Arpa, Çeltik, Kanola, Yer Fıstığı, Yulaf	Tohumdan hasada kadar gelişme dönemi boyunca uygulanabilir	200	1,5 - 2,0 L
Fasulye, Nohut, Mercimek, Bakla, Bezelye	Çiçeklenme dönemi öncesi ve tane oluşum döneminde 2 uygulama olarak uygulayınız.	200	1,5 - 2,0 L
Kavun, Karpuz, Kabak	Fide dikimden itibaren hasada kadar 7-10 günlük aralıklarla uygulayınız.	150	1,0 - 1,5 L
Soğan, Sarımsak	Dikimden itibaren hasada kadar 7-10 günlük aralıklarla uygulayınız.	150	1,0 - 1,5 L
Mısır, Ayçiçeği, Susam, Aspir, Pamuk	Gelişme, 4 ve 8 yaprak dönemlerinde 10-14 gün aralıklarla uygulayınız.	200	1,5 - 2,0 L
Fındık, Ceviz, Badem	Gelişmenin erken dönemlerinde 10-14 gün aralıklarla 4 uygulama olarak uygulayınız.	200	1,5 - 2,0 L
Patates, Pancar, Havuç	4-5 yaprak döneminden itibaren ve yumru gelişme döneminde 2 uygulama olarak uygulayınız.	200	1,5 - 2,0 L
Çilek, Bağ, Muz, Turuncgiller, Zeytin	İlk bahar döneminden itibaren hasada kadar 7-10 gün aralıklarla uygulayınız.	200	1,5 - 2,0 L